ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ

на провед	ение вакцинации	, или отказ от нее.
		(наименование вакцины)
1.Я, нижеподписав	шийся(аяся)	
	(фам	илия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
«»	года рождения,	зарегистрированный по адресу:
	(a	дрес места жительства гражданина)
настоящим подтвер	рждаю то, что проинформ	
а) о том, что прос	филактическая вакцинац	ия-это введение в организм человека медицинског
	ского препарата для со нфекции (COVID-19) у взро	здания специфической невосприимчивости к ново ослых.
Вакцина получена человека вирус	биотехнологическим пу	тем, при котором не используется патогенный дл
	оат состоит из двух компс	онентов: компонент I и компонент II.;
	ости проведения профи	плактической вакцинации, 2 этапах вакцинации
синдром, характер астенией, общим на гиперемия, отечно разрешаются в тече г) о необходимости (а при необходимо д) о выполнении пр Я имел(а) возмож ответы. Получив полную из КОВИД-Вак комбин вызываемой виру осложнениях, я по на проведение в	оизующийся озноб, повынедомоганием, головной недомоганием, головной ость), которые могут развение 3-х последующих дни обязательного медицинского обслоредписаний медицинских кность задавать любые в нформацию о необходим нированной векторной важем SARS-CoV-2, возмордтверждаю, что мне понявакцинации Гам-КОВИД	ского осмотра перед проведением этапов вакцинаци едования);
Я, нижеподписавш	ийся(аяся)	· ·
,	, ,	(фамилия, имя, отчество)
	векторной вакциной для	проведения вакцинации Гам-КОВИД-Вак, профилактики коронавирусной инфекции,
Дата		(подпись)
Врач		
(фами	илия, имя, отчество)	(подпись)
Дата		

АНКЕТА ПАЦИЕНТА

ФИО			
Дата рождения			
	ДА	HET	
Болеете ли Вы сейчас?			
Были ли у Вас контакты с больными с инфекционными заболеваниями в последние 14 дней?			
Болели ли Вы COVID-19? (если да, то когда)			
<u>Для женщин</u>			
 Вы беременны или планируете забеременеть в ближайшее время? 			
• Кормите ли Вы в настоящее время грудью?			
Последние 14 дней отмечались ли у Вас:			
-Повышение температуры			
-Боль в горле			
-Потеря обоняния			
-Насморк			
-Потеря вкуса			
-Кашель			
-Затруднение дыхания			
Делали ли Вы прививку от гриппа или пневмококка Если «да», указать дату			
Были ли у Вас аллергические реакции?			
Есть ли у Вас хронические заболевания Указать какие			
Какие лекарственные препараты Вы принимаете последние 30 дней:			
Принимаете ли Вы преднизолон?			
Принимаете ли Вы противоопухолевые препараты?			
Принимаете ли Вы противовирусные препараты?			
Проводилась ли Вам лучевая терапия в течении последнего года?			
Были ли у Вас побочные реакции на вакцинацию в прошлом?			

Дата	Подпись
Дата	ПОДПИСВ

Памятка пациента о проведении вакцинации против COVID-19 вакциной «Гам-Ковид-Вак»

Уважаемый пациент!

Ваше крепкое здоровье-наша главная цель! А для того, чтобы полностью реализовать наш потенциал в достижении главной цели, мы просим Вас соблюдать некоторые (основные и важные) правила, которые помогут нам в нашей работе:

- 1. Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к SARS-CoV-2 по результатам лабораторных исследований.
- 2. Противопоказаниями к вакцинации являются:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- -тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- -острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- -обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
- -беременность и период грудного вскармливания;
- -возраст до 18 лет;
- 3. Перед проведением вакцинации необходим обязательный осмотр врача с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, осмотром зева на основании которых врач-специалист определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.
- Врач расскажет Вам о возможных реакциях на вакцинацию и поможет заполнить информированное добровольное согласие на проведение вакцинации.
- 4. Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0.5 мл. Препарат вводят внутримышечно. На 21 день вводят компонент II в дозе 0.5 мл. Препарат вводят внутримышечно.
- 5. В течение 30 мин после вакцинации просим Вас оставаться в медицинской организации для предупреждения возможных аллергическим реакций.
- 6. После проведения вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться и разрешаются в течении трех последующих дней кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда-увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.

Рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации - нестероидные противовоспалительные средства.

Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого пациента необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.